



إعداد  
د.سمية أحمد حسنين  
د. نبيل فتحي السيد قنديل  
المادة العلمية    معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة

**مقدمة:**

يعتبر قطاع الزراعة أحد أهم القطاعات الرائدة فى الأقتصاد القومى المصرى حيث يعمل من خلال استراتيجيات متكاملة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والتي تتمشى مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مما له الأثر فى رفع معدلات التنمية الزراعية وزيادة الإنتاجية المحصولية وزيادة الصادرات وزيادة رقعة الأراضى المستصلحة وتعظيم الأستفادة من المخلفات الزراعية وترشيد استخدام الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات والذي يؤدى الى حماية البيئة من التلوث وتحقيق الأمن الغذائى الصحى فى مصر خالى من الكيماويات.

وتتعرض التنمية الزراعية الى بعض المفاهيم الحديثة فى البيئة ومن أهمها الزراعة النظيفة. وقد إهتمت وزارة الزراعة بمختلف هيئاتها بالزراعة النظيفة فى مجالات البحث والإنتاج الزراعى لأحداث طفرة فى الإنتاج الزراعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى ومحاولة للتصدير بمواصفات يقبلها السوق العالمى خالى من الكيماويات مما يجعلها آمنة على صحة الفرد والحد من مشكلة التلوث.

**ويشمل مفهوم الزراعة النظيفة مايلى:-**

أولاً:- الاتجاهات الحديثة فى مجال مكافحة المتكاملة للآفات الزراعية.

أ- العمليات الزراعية.

ب- استخدام الفرمونات.

ج- استخدام مكافحة الحبيوية (البيولوجية).

د- زراعة أصناف نباتية مقاومة.

هـ- استخدام نظام التنبوء والإنذار المبكر (الاستشعار عن بعد).

ثانياً : التسميد الأخضر.

ثالثاً: التسميد الحيوى.

أ-مخصبات تثبت النتروجين الجوى تكافلىاو غير تكافلى

ب- مخصبات إذابة ومعدنة الفوسفات العضوية.

رابعاً: السماذ العضوى الصناعى من المخلفات الزراعية.

خامساً: استخدام الطحالب كمحسن للأراضى الصحراوية المستصلحة حديثاً.

سادساً : استخدام الهندسة الوراثية فى إنتاج واعتماد التقاوى وكذلك تجميع الأصول الوراثية فى مجموعات نباتية لحفظ هذه الأصول.

## أولاً : الاتجاهات الحديثة في مجال مكافحة المتكاملة الآفات الزراعية

قامت وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج مكافحة المتكاملة وذلك للاقلال من إستخدام المبيدات الكيماوية منذ عام ١٩٩٥ وذلك باتباع بعض الوسائل والعمليات المناسبة بهدف المحافظة على أعداد هذه الآفات عند مستويات دون الضرر الاقتصادي لها بهدف الحد من إستخدام المبيدات الكيماوية في مقاومة الآفات الزراعية ومن هذه الوسائل والعمليات:-

### (أ) العمليات الزراعية

#### ١-التبكير فى الزراعة:-

أدت الزراعة المبكرة إلى الحصول على بادات للقطن قوية تتحمل الإصابة بالآفات الأولى مثل الدودة القارضة والحفار والتريس والمن والعنكبوت الأحمر وكذلك حماية النباتات من الإصابة بديدان اللوز آخر الموسم مما يؤدى إلى المحافظة على اللوز المتكون فى الحجر والذى يمثل ٦٠ % من المحصول الرئيسى وبالتالي إنخفضت كمية المبيدات المستخدمة فى مكافحة الآفات الأولى وديدان اللوز.

#### ٢-العزيق:-

أدت عمليات العزيق المتقن والمتطور إلى التخلص من كثير من الحشائش الضارة والتي تعتبر العائل الرئيسى للآفات خصوصاً آفات البادات الأولى مثل الدودة القارضة والتريس والمن والعنكبوت الأحمر كما أدى ذلك إلى تعريض عذارى دودة ورقة القطن والدودة القارضة لأشعة الشمس والأعداء الحيوية من الطيور النافعة للقضاء عليها.

#### ٣-دفن الأحطاب :-

أدى التخلص من اللوز العالق بالأحطاب عن طريق دفنها فى باطن التربة قبل أول فبراير من كل عام إلى القضاء على اليرقات الساكنة نتيجة إصابة اللوز الأخضر فى الموسم السابق والتي تعتبر أهم مصدر إصابة اللوز الأخضر فى الموسم التالى بالجيل الأول لهذه الآفة.

#### ٤ - إزالة الحشائش المعمرة :-

إزالة الحشائش على جسور الترع والمصارف والطرق العامة والمنتشرة حول الزراعات قلل من الإصابة بكثير من الآفات الضارة خصوصاً المن والتريس والذبابة البيضاء والعنكبوت الأحمر.

### (ب) - إستخدام الفرمونات :

يستخدم حالياً نوعان من أنواع الفرمونات:-

#### ١-فرمونات الأنابيب والرشد " فرمون التشويش":-

تعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعياً ورشها على النباتات أو ربطها على سيقانها فى صورة أنابيب أو حلقات فى المساحات الكبيرة ، حيث يؤدى ذلك إلى تشتيت وبعثرة الذكور وعدم إلتقائهما بالإناث وبالتالي تقل فرصة التزاوج ووضع بيض غير مخصب لا يفقس يرقات مما يؤدى إلى تقليل الإصابة كما هو متبع حالياً بالنسبة لمكافحة ديدان اللوز فى محصول القطن.

#### ٢-فرمون الكبسولات " الجاذبات الجنسية":-

وتعتمد فكرته على تخليق رائحة إناث الفراشات صناعياً ووضعها فى كبسولات داخل مصائد خاصة ( مائية / ورقية) لاصطياد ذكور الفراشات فتقل فرص التزاوج بينها أيضاً مما يؤدى إلى وضع بيض غير مخصب

لايفقس يرقات كما هو متبع حاليا بالنسبة لمكافحة دودة ورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية والامريكية.

وهناك طريقتان لاستخدام الجاذبات الجنسية إما للجذب الجنسي أو لعاقة التزاوج حيث أن :-

أ - بالنسبة للجذب تستخدم كمصائد وكبسولات متخصصة للآفة حيث توضع هذه المادة في كبسولات مختلفة الشكل توضع في مصائد خاصة لاصطياد الذكور من الطبيعة داخل الحقول وبالتالي تقل فرص التزاوج وتخفض نسبة الإصابة.

ب - بالنسبة لعاقة التزاوج أو التشويش حيث تستخدم الجاذبات الجنسية ( الفرمونات ) رشاً أو توضع في أنابيب خاصة تثبت على سيقان النباتات لعمل تشويش أى لبعثره الذكور وعدم التقاءها بالأنثى لفترة طويلة وهذا يؤدي إلى قلة فرص التزاوج ويفضل استخدام هذه الطريقة في التجميعات الكبيرة لتحقيق أعلى كفاءة للفرمونات وأن يتقارب مواعيد الزراعة بكل تجمعة بقدر الإمكان.

### تعليق أنابيب فرمون التشويش على نباتات القطن (٢)



### استخدام الجاذبات الجنسية في مكافحة دودة اللوز القرنفلية (٣)



ومن فوائد طريقة الفرمونات في مكافحة المتكاملة :-

١ -دراسة تحديد مواعيد ظهور الآفة وكثافة تعدادها وتذبذبها خلال الموسم.

٢- جمع أكبر عدد من ذكور الآفة لخفض فرص التزاوج وبالتالي الإصابة.

٣- التنبيه المبكر بحجم الإصابة بالمحصول والحد من تعداد الآفات.

٤ - عدم تلوث البيئة وأعتدال التوازن الطبيعي بين الآفة وأعدائها الحيوى والمحافظة على الحشرات الملقحة ونحل العسل.

(ج)- إستخدام مكافحة الحيوية ( البيولوجية) فى القضاء على الآفات الزراعية :-

أ - البكتريا الممرضة..

إستخدمت البكتريا الممرضة لمقاومة الآفات حيث تظهر البكتريا تحت الميكروسكوب على شكل ماسات بلورية تكمن بداخلها المادة الفعالة وبمجرد أن تأكل الحشرة هذه البلورات يذوب الجدار الماس للبكتريا وتتطلق المادة الفعالة حيث تسبب موت الحشرات ( وبخاصة حرشفية الاجنحة) نتيجة الأثر السام لهذه البكتريا على الحشرة فقط وتتم قتل الحشرة بعد ٤-٥ ايام من تناولها لهذه البكتريا علما بان هذه الحشرة خلال هذه المدة تظل ساكنة وينعدم أثرها نهائيا على النبات. وإستخدام هذه البكتريا يتميز بأنه أكثر أمنا للإنسان والحيوان والنبات وليست لها آثار متبقية على النباتات ولا تضر الانسان ولا تسبب التلوث للبيئة وتستخدم هذه البكتريا فى مقاومة آفات المحاصيل حرشفية الاجنحة ومنها الدودة القارضة ( بعمل طعم سام منها) ودودة ورق القطن وغيرها عن طريق الرش.

ب - النيما تودا الممرضة.

تستطيع أن تصل إلى الآفة ( شكل حشره جعل الورد الزغبى وغيرها) تحت الأرض أو داخل الجزأ المحمى من النبات وتقتل الحشرة خلال ٤٨ ساعة حيث تتوالد النيما تودا على الآفة ثم تبحث عن آفات أخرى وهكذا حتى يتم القضاء على تلك الآفات. وهناك أنواع أخرى من البكتريا والفطريات والفيروس يمكنها القضاء على تلك الآفات التى تصيب المحاصيل المختلفة. وهذه الطرق تساعد على حماية البيئة من التلوث وتنشيط الاعداء الحيوية للآفات مثل أبو قردان وتحقيق التوازن الطبيعي بين الكائنات الحيه.

ج - منظمات النمو وهرمونات الانسلاخ.

وهى المواد التى تنظم نمو الحشرة وها وكذلك إستتيعق إستمرار نمودام هرمونات الانسلاخ للحشرات فى القضاء عليها.

د - تعقيم ذكور الحشرات.

وذلك لمقاومة حشره ذبابه الفاكهة بتعقيمها وأطلاقها فى الجو مما يؤدى إلى وضع بيض غير مخصب ويتم القضاء على تلك الآفة.

١ - إستخدام بدائل المبيدات:-

تعتبر بدائل المبيدات الآمنة من المتغيرات اللافتة للنظر فى مجال وقاية النبات من الآفات ووقاية الإنسان من أضرار متبقيات المبيدات الكيماوية والحفاظ على البيئة المصرية من الملوثات الكيماوية بالإضافة إلى خفض تكاليف المكافحة لتعظيم الإنتاج المحاصيل.

ومميزات بدائل المبيدات الآمنة للآفات الحشرية عديده منها :-

١ - عباره عن مركبات حيوية ومواد طبيعية غير ضاره للإنسان أو النبات أو البيئة.

٢ - مواد أقل سمية للآفات عن المبيدات الكيماوية.

٣- رخيصة الثمن عن المبيدات الكيماوية.

٤- يبدأ استعمالها عند مستويات إصابة أقل من المبيدات الكيماوية والاكتشاف المبكر للإصابة لذا يمكن تكرار الرش للحصول على أفضل النتائج.

٥- عند استعمال المركبات الحيوية يجب أن يثق المزارع أن الآفة لن تموت فوراً بل تحتاج لفترة حضنة داخلها.

٦- فترة السماح بعد الرش وعند القطف تكاد تكون معدومة في حالة استخدام بدائل المبيدات الآمنة.

٧- هي الوسيلة الآمنة وتصلح للمستوى الثقافي متفاوت في مجال مكافحة الآفات.

٨- أخطاء استعمال بدائل المبيدات لا تسبب ضرراً للمزارع أو حيواناته أو بيئته.

٩- التصدير من المهام الأساسية عند تطبيق بدائل المبيدات.

١٠- تكرار استعمالها يؤدي إلى زيادة الأعداء الطبيعية مما يقلل من استخدام المبيدات الكيماوية.

١١- بدائل المبيدات الآمنة أمان للمنتج وضمان للمصدر حيث غذاء خالي من الكيماويات وحفظ للبيئة من التلوث.

١٢- زياده الناتج القومي والفردى نتيجة نجاح مكافحة وتمتع الإنسان بالصحة والعافية.

ومن أمثلة بدائل المبيدات :-

إستخدام كبريتات الألومونيوم ( الشبة الزفرة ) :

وقد إستخدمت فى مقاومة الحفار والدودة القارضة عن طريق عمل الطعوم وخلطها بنصف جرعة المبيد الموصى بها فى عملية مكافحة كمادة قابضة للفكوك والامعاء لمنع التغذية والقضاء على هاتين الآفتين.

٢- إستخدام الكبريت الزراعى:

وقد تم إستخدامة للحد من الإصابة بالحشرات الماصة مثل المن والذبابة البيضاء والعنكبوت الأحمر ودودة ورق القطن وديدان اللوز القرنفلية والشوكية والامريكية. كمادة طاردة لإناث الفراشات ومهلكة للفقس الحديث لليرقات.

٣- إستخدام السولار :

وقد تم إستخدامة فى مقاومة دودة القطن والدودة القارضة لقتل اليرقات والعذارى الموجودة فى التربة عن طريق اضافته لمياه الرى مما يؤدي الى منع أكسجين الهواء عنها فيسبب موتها والقضاء عليها.

٤- إستخدام خميرة البيرة والعسل الأسود:

وقد تم إستخدامها فى مقاومة المن والذبابة البيضاء والحشرات القشرية والبق الدقيقى كمادة مطهره تتنافس وتقضى على الفطريات التى تنمو على الإفرازات العسلية وتمنع ظهور الإصابة بفطر العفن الأسود.

٥- إستخدام زيت الرجوع ( العادم ) :

وقد تم إستخدامة فى عمل المصائد الشحمية لإصطياد الحشرات الطائرة من المن والذبابة البيضاء والجاسيد وكذلك فى مقاومة حفارات أشجار الفاكهة.

#### ٦- إستخدام الصابون المتعادل :

وقد تم إستخدامه فى الرش ضد المن والذبابة البيضاء والجاسيد على أن يعقبة التعفير بالكبريت بمعدل ٥كجم/فدان.

مما تقدم يلاحظ أن الهدف الرئيسى من عملية استخدام بدائل المبيدات هو عدم التدخل باستخدام المبيدات الكيماوية إلا فى حالة الضرورة القصوى وعند الوصول إلى الحد الحرج للإصابة والذى يحدث عنده الضرر وذلك بهدف:-

١ - تقليل التكاليف الكلية المستخدمة فى عملية مكافحة.

٢ - تقليل التلوث البيئى بالنسبة للإنسان والحيوان والنبات.

ويعتبر ذلك بفضل الله وتوفيقه نجاحاً ملموساً للمحافظة على البيئة من أخطر الملوثات البيئية وأشدّها ضرراً وهى المبيدات الكيماوية.

#### (د) - زراعة اصناف نباتية مقاومة.

يجب زراعة الأصناف النباتية المقاومة للأفات (أمراض -حشرات) حيث يعتبر ذلك الأسلوب الفعال فى مكافحة المتكاملة وعلى سبيل المثال فإن هناك ما يقرب من مائة وخمسين صنفاً مقاوماً لأفات النيماتودا تضم خمسة وعشرون محصولاً. وتأتى هذه الأصناف النباتية المقاومة من برامج التربية التى يركز فيها الباحثون على إنتخاب العوامل الوراثية المقاومة للمسببات المرضية والحشرية وبذلك يمكن الحصول على إنتاجية عالية كما ونوعاً.

#### (هـ) - استخدام نظام التنبؤ والأذار المبكر.

وذلك للتعرف على الأمراض النباتية خاصة البوائية مثل الندوة المتأخرة على البطاطس والطماطم والصدأ فى القمح واللفحة النارية فى الكمثرى وبذلك يمكننا من المتابعة المستمرة لمستويات الإصابة بالآفات وتحديد الوقت المناسب للتدخل بالمكافحة. ويجب معرفة حركة المسببات المرضية والحشرية وحالة النباتات الصحية وإذا لم يتم ذلك فإنه قد يحدث مضاعفة لأعداد الآفات المرضية والحشرية وقد يحدث الضرر خلال أيام قليلة وبذلك يصبح التدخل بالمكافحة عديمة الجدوى.

#### ثانياً: التسميد الأخضر

يقصد بالتسميد الأخضر زراعة أي محصول بغرض حرثه فى الأرض عند بلوغه طور معين من أطوار نموة . وينصح باتتباعه لعدة سنوات لامكان إحداث زيادة فى المادة العضوية بالأرض و المحاصيل المستخدمة غالباً هى البقوليات وأهمها الترمس وهو الشائع فى مصر وكذلك يمكن استخدام النباتات الغير بقولية مثل البرسيم .

#### أهمية التسميد الأخضر :

١ - زيادة المادة العضوية فى التربة ..

حيث يستخدم هذا النوع من التسميد فى الأراضى الرملية أو الأراضى الخفيفة. وتختلف المادة العضوية الناتجة من المحاصيل المستعملة حسب نوع النبات المستخدم وحسب الظروف المحيطة به وتتحلل المادة العضوية بعد حرثها فى الأرض بسرعة ويختلف ذلك حسب نوع النبات وعمره ومدى توفر العناصر



الغذائية المعدنية في الأرض وطبيعة الكائنات الدقيقة في الأرض ودرجة تهوية الأرض وحرارتها ونسبة الرطوبة .

## ٢- زيادة الأزوت في التربة ..

غالبا ما تستعمل المحاصيل البقولية في التسميد الأخضر ومعروف عنها أنها تستفيد من أزوت الهواء الجوى بواسطة البكتريا العقدية وتختلف كمية الأزوت المتحصل عليها على نوع المحصول البقولى ومدى التسميد بالأزوت أو الفوسفور وعادة ما تعطى المحاصيل البقولية جرعة بسيطة لتساعدها في بداية حياتها حتى تتكون العقد الجذرية وتكون قادرة على تثبيت الأزوت الجوى وإمداد النبات به.

## ٣- المحافظة على العناصر الغذائية في التربة .

في حالة وجود محصول يغطى الأرض فأنه يمتص العناصر الغذائية النباتية وبذلك تكون أقل عرضة للفقد مثل النترات نظراً لسرعة ذوبانها ولأنها لا تمتص على غرويات الأرض وكلما كان المجموع الجذرى للنبات كبير كان أكثر كفاءة في تجميع العناصر الغذائية وحفظها من الفقد .

## ٤- تركيز العناصر الغذائية في الطبقة السطحية من التربة .

تقوم محاصيل التسميد الأخضر وخاصة إذا كانت ذات مجموع جذرى عميق بتجميع كميات كبيرة من عناصر الغذاء النباتى من طبقة تحت التربة وعندما يتم قلب المحصول في الأرض ويتحلل في الطبقة السطحية تتطلق تلك العناصر وتتركز في مساحة محدودة وهذا يسمح للمحاصيل التالية بالاستفادة من هذه العناصر .

## ٥- زيادة صلاحية بعض العناصر الغذائية .

تزداد صلاحية العناصر الغذائية بالتسميد الأخضر وذلك نتيجة لاثار الأحماض العضوية الناتجة من تحلل المادة العضوية المضافة والتي تؤدي الى ذوبان مركبات تلك العناصر العسرة الذوبان وتحويلها الى صورة صالحة لأمتصاص النبات .

## ٦- تحسين طبقة تحت سطح التربة ..

يمكن للنباتات التي تتميز جذورها بطول القمة النامية أن تتعمق في طبقة تحت التربة كلما كان ذلك ممكنا وعندما تموت هذه الجذور تتحلل وتتكون العديد من القنوات والأنفاق وهذه تسهل تخلل الهواء ومرور الماء في التربة .

## ٧- زيادة نشاط الأحياء الدقيقة ..

تستخدم المادة العضوية المضافة عن طريق التسميد الأخضر كغذاء للأحياء الدقيقة بالأرض كما انها تؤدي الى تنشيط بعض التفاعلات البيولوجية بدرجة كبيرة ويتوقف أثر الأسمدة الخضراء على زيادة الكائنات الحية الدقيقة على نوع المحصول وعمره وخواص الأرض ودرجة تهويتها وإحتوائها على العناصر الغذائية المعدنية .

## ٨- إبادة الحشائش ..

عملية حرث النباتات في الأرض تقضى على الحشائش لأنها تحرث قبل أن تكون قد كونت الثمار والبذور .

**الشروط الواجب مراعاتها عند التسميد الأخضر**



١- يجب ألا تترك هذه المحاصيل حتى تكون البذور بل يكفي نموها حتى طور الأزهار حيث تكون قد جمعت أكبر قدر من الأسمدة النتروجينية .

٢- لا بد أن تمر فترة مناسبة بعد حرث السماد الأخضر وزراعة المحصول التالي حتى تتحلل المواد العضوية للسماد الأخضر بتوفر التهوية الجيدة والرطوبة المناسبة فقد يضر المحصول التالي إذا زرع مباشرة بعد حرث السماد الأخضر .

### العوامل التي تحد من إستعمال التسميد الأخضر

- ١- أن محاصيل التسميد الأخضر تشغل الأرض على حساب المحاصيل الأخرى .
- ٢- لا يتخلف عن التسميد الأخضر في التربة كمية من الدبال وذلك نظراً لأحتواء النباتات المستخدمة على نسبة قليلة من السيليلوز و اللجنين.
- ٣- يعمل التسميد الأخضر على هدم الدبال الأصلي للتربة وذلك نظراً لسرعة تحلل النباتات المستخدمة وما يتبع ذلك من زيادة عدد ميكروبات التربة الى الحد الأقصى ومهاجمة هذه الميكروبات للدبال من أجل الحصول على بعض ما يلزمها من طاقة وغذاء .

### ثالثاً: التسميد الحيوى

تعتبر الأسمدة او المخصبات الحيوية مصادر غذائية للنبات رخيصة الثمن بديلاً عن استخدام الأسمدة المعدنية والتي لها الأثر في تلوث البيئة سواء كان للتربة أو المياه عند الأسراف في استخدامها. وتنتج هذه المخصبات من الكائنات الحية الدقيقة وتستعمل كلفاح حيث تضاف الى التربة الزراعية اما ننثرها او بخلطها مع التربة او بخلطها مع بذور النبات عند الزراعة. والمخصبات الحيوية نوعان :-

\* الأول.. مخصبات تقوم بتثبيت النتروجين الجوى سواء تكافلياً او غير تكافلياً وتوفر (٢٥%) من الأسمدة النتروجينية. ومن أمثلتها .. ( السيريالين - الريزوباكترين - البيوجين -الأزولا).

\* الثانى.. مخصبات تقوم باذابة ومعدنة الفوسفات العضوية وتحولها من الصورة الغير صالحة الى صورة ميسرة قابلة للأمتصاص بواسطة النبات مثل الفوسفورين وتوفر (٥٠) من الأسمدة الفوسفاتية.

\* ويتحقق استخدام المخصبات الحيوية فوائد عديدة عند استخدامها كبديلا للأسمدة الكيماوية منها:-

١- اعادة توازن الميكروبات بالتربة وتنشيط العميات الحيوية بها.

٢- ترشيد استخدام الأسمدة المعدنية والحد من تلوث البيئة.

٣- زيادة الإنتاجية المحصولية والجودة العالية الخالية من الكيماويات.

ويعتبر التسميد الحيوى عنصر هام من عناصر تقليل الضرر الناتج عن إستخدام الأسمدة الكيماوية ويسد جزء كبير من الأحتياجات السمدية ويوفر القدر الكبير الذى ينفق فى إنتاجها ويساعد على تقليل الطاقة المستخدمة فى إنتاجها . كما ان كثير من المزروعات البقولية ترتبط بإستخدام المخصبات الحيوية وهذا يزيد من كمية البروتينات التى يحتاجها الإنسان وبذلك يتم التوازن فى مكونات الغذاء بأقل التكاليف ودون تلوث للبيئة .

ومن أمثلة المخصبات الحيوية المستخدمة حالياً فى الزراعة النظيفة بمصر والتي تنتجها وحدة المخصبات الحيوية- مركز البحوث الزراعية هي:-

١- **بلوجين...** مخصب حيوى يحتوى على الطحالب الخضراء المزرققة القادرة على تثبيت النيتروجين الجوى فى أجسامها بتحويله إلى مركبات أزوتية يمكن للنبات الاستفادة منها ويوفر ما مقداره ١٥ كجم أزوت /الفدان.

٢- **ميكروبين...** مخصب حيوى مركب يتكون من مجموعة كبيرة من الكائنات الحية الدقيقة التى تزيد من خصوبة التربة ويقلل من معدلات إضافة الاسمدة الأزوتية والفوسفاتية والعناصر الصغرى بما لا يقل عن ٢٥% ويحد من مشكلات التلوث البيئى ويضاف إلى التقاوى السابق معاملتها بالمبيدات والمطهرات الفطرية.

٣- **فسفورين...** مخصب فسفورى حيوى يحتوى على بكتريا نشطة جداً فى تحويل الفوسفات الثلاثى الكالسيوم غير الميسر والمتواجد فى الأراضى المصرية بتركيزات عالية نتيجة للاستخدام المركز للاسمدة الفوسفاتية وتحويلة إلى فوسفات أحادى ميسر للنبات ويضاف عقب الزراعة وأثناء وجود النبات بالحقل.

٤- **سيريا لين...** يستخدم فى التسميد الحيوى للمحاصيل النجيلية مثل (القمح- الشعير -الارز - الذرة) المحاصيل الدنيبة مثل ( السمس وعباد الشمس) - والسكرية مثل ( بنجر السكر وقصب السكر) وهو يقلل من استخدام المعننية بمقدار ١٠-٢٥% من المقررات السمادية للفدان.

٥- **نتروبين...** مخصب حيوى أزوتى لجميع المحاصيل الحقلية والفاكهة والخضر فهو يحتوى على بكتريا مثبته للأزوت الجوى ويوفر ٣٥% من كمية الاسمدة الأزوتية المستخدمة.

٦- **العقدين...** مخصب حيوى أزوتى للمحاصيل البقولية الصيفية مثل (فول الصويا- الفول السودانى- اللوبيا -فاصوليا) والمحاصيل البقولية الشتوية ( فول بلدى - برسيم - عدس- حلبة - فاصوليا- بسلة - ترمس). ويتم خلطة مع التقاوى قبل الزراعة مباشرة.

٧- **أسكورين...** منشط نمو طبيعى للمحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة وتحتوى على مواد عضوية مغذية للنبات بنسبة ٦٢%. يوفر ٢٥% من المقررات السمادية الأزوتية الموصى بها.

٨- **ريزوباكثيرين...** مخصب حيوى فعال يستخدم فى المحاصيل الحقلية والخضر والفاكهة ويحتوى على أعداد عالية من البكتريا المثبته للأزوت الجوى تكافلياً ولا تكافلياً والمحملة على Peat Moss. ويوفر كمية السماد الأزوتى الكيماوى المقرره للفدان بنسبة من ٢٥% للنبات غير البقولى ، ٨٥% للنبات البقولى.

٩- **النماليس...** مخصب ومبيد حيوى للقضاء على النيما تودا. ومن مميزاتة :

\* القضاء على يرقات وبويضات النيما تودا.

\* زيادة خصوبة التربة.

\* رخص تكاليف المقاومة.

\* عدم التأثير على الكائنات الحية الدقيقة النافعة للتربة.

\* الحفاظ على نظافة البيئة.

١٠- **الأزولا ..** وهى من النباتات الأولية التى تتعايش معها الطحالب الخضراء المزرققة المثبته للأزوت الجوى وتنمو على سطح المياه فى حقول الأرز وتوفرها وزارة الزراعة بكميات كبيرة فى محافظات زراعة الأرز بمصر .

#### رابعاً : السماد العضوي الصناعي من المخلفات الزراعية

يؤدي غياب التسميد العضوي إلى الإسراف في استخدام الأسمدة المعدنية تحت نظام الزراعة الكثيفة والتي تلوث التربة والمياه وبالتالي النبات - الأمر الذي جعل مستوى المادة العضوية بالتربة من العوامل المحددة للإنتاج. من هذا المنطق فإن التوسع في برامج الزراعة العضوية يتحقق بالاستخدام المنظم للأسمدة العضوية مما يؤدي إلى الحفاظ على خصوبة التربة وتحسين خواصهما وإنتاج غذاء آمن صحياً.

**ويقصد بالزراعة العضوية ...** هو التسميد بالأسمدة العضوية المصنعة من المخلفات الزراعية لأسترجاع العناصر السمدية التي أخذت من التربة خلال نمو النباتات. حيث عندما تضاف الأسمدة العضوية للتربة الزراعية تتناولها الكائنات الدقيقة بالتربة بالهدم والتحليل منتجة المركبات العضوية البسيطة والعناصر السمدية المغذية الميسرة للنباتات والتي تمكث بالتربة فترة طويلة وبصفة مستمرة وتعطي لها خصوبتها الأمر الذي يتحقق معه:-

١ - حماية البيئة من التلوث نتيجة ترشيد استهلاك الأسمدة المعدنية.

٢ - إنتاج غذاء نظيف آمن صحياً للإنسان والحيوان خالي من الكيماويات.

#### ومميزات الأسمدة العضوية المصنعة :-

١ - جودة التحلل وأندام الرائحة.

٢ - إرتفاع محتواه من العناصر السمدية والمادة العضوية.

٣ - خلوه من بذور الحشائش و النيماتودا ومسببات الأمراض للنبات.

#### ويختلف نوع السماد العضوي باختلاف مصادره كما يلي:-

١ - السماد البلدي.. ناتج التخمير الهوائي لروث الماشية والمخلفات الحيوانية الأخرى.

٢ - السماد العضوي الصناعي.. ناتج التخمير الهوائي لمخلفات المحاصيل والبقايا الحيوانية.

٣ - سماد الدواجن.. ناتج التخمير الهوائي لزرق الدواجن.

٤ - سماد البودريت.. ناتج عن التجفيف الهوائي للحماه المعالجة.

٥ - سماد الكومبوست.. ناتج عن التخمير الهوائي لمخاليط المخلفات النباتية والحيوانية أو الأسمدة النتروجينية.

٦ - سماد القمامة.. ناتج من التخمير الهوائي لقمامة الشوارع في المدن والقرى.

٧ - سماد البيوجاز.. ناتج عن التخمير اللاهوائي للمخلفات النباتية والحيوانية والأدمية بعد إنتاج غاز الميثان كمصدر دائم ومتجدد للطاقة.

#### كيفية اعداد السماد العضوي :-

لمخلفات الحقل غير ذات القيمة الاقتصادية أهميتها في تصنيع أسمده عضوية جيدة وتضم هذه المخلفات ورق الاشجار والخضروات ومصاص القصب وأنواع التبن المختلفة وبقايا تقليم الاشجار ولتحويل هذه المخلفات إلى سماد عضوي صناعي جيد لابد من توافر عدة شروط من أهمها :-

- أن تكون المادة مجزأة بحيث لا يزيد طولها عن ١٠-١٥ سم.
- إضافة كمية كافية من النيتروجين.
- كبس الكومة جيدا.
- يكون الوسط ملائم لنشاط الميكروبات المحللة للمخلفات.
- تكون درجة حراره الكومة فى الحدود المناسبة (٣٠-٣٥ م).

#### مراحل تصنيع السماد العضوى الصناعى من المخلفات النباتية(٤)



العوامل التى تؤثر على درجة ومعدل تحلل بقايا المحاصيل والمخلفات العضوية فى التربة :

١- التركيب الكيماوى للمخلفات.	٦- درجة التهوية بالتربة.
٢- نسب ك : ن.	٧- درجة الرطوبة.
٣- محتواها من اللجنين.	٨- رقم pH .
٤- درجة تجزئة المادة العضوية.	٩- محتوى الأرض من العناصر الصالحة.
٥- طبيعة الميكروبات السائدة.	١٠- قوام الأرض.

#### ١ - الطريقة الأولى ... استخدام سائل الاسطبل

أ- توضع كمية من القش فى سائل المجارى لمدة ساعات لترطية ثم يفرش على ربع المساحة المخصصة لعمل السماد - يكرر العمل فى اليوم التالى فى الربع الثانى من المساحة ويكرر ذلك فى اليوم الثالث والرابع.

ب- فى اليوم الخامس تكبس الطبقة التى تم عملها فى اليوم الاول ويوضع فوقها طبقة جديدة وهكذا فى اليوم السادس والسابع والثامن.

ج- يستمر فى وضع طبقات التخمر حتى يصل إرتفاع الكومة إلى ٣-٤ متر ثم تغطى بطبقة من التراب وتترك الكومة ٣-٤ أشهر للتخمر يتم بعدها نضج السماد والذى يصل فيه نسبة النيتروجين به حوالى ١-١.٥% محسوبة على أساس الوزن الجاف.

#### ٢ - الطريقة الثانية ... استخدام الاسمدة الكيماوية

أ- تقسم الكمية من المخلفات المراد تحويلها إلى ١٠ أجزاء - بفرش "عشر" الكمية على مساحة الكومة ويرش "عشر" الكمية ماء ثم ينثر عليها بالتساوى عشر كمية مخلوط السماد المطلوب ثم يسير العمل بهذه الطريقة حتى يتم عمل عشره طبقات - ثم ترش الكومة بالماء ويلزم لكل طن ما يقرب من ٨٠٠ لتر ماء بعد الأسبوع الأول ، ٨٠٠ لتر بعد الاسبوع الثانى ، ٨٠٠ لتر بعد الأسبوع الثالث - ثم بعد ذلك ترش الكومة بالماء كلما لزم الامر.

ب- تقلب الكومة بعد ٦ أسابيع ومره أخرى بعد ثلاث أسابيع من المره الاولى ثم مره ثالثة بعد أسبوعين من المره الثالثة - ينضج السماد بعد ٣-٨ أشهر ويحتوى السماد الناتج على ٦٠% رطوبة - ١٥% مادة عضوية - ٠.٦% نيتروجين - ٠.٤% فوسفور (P2O5) - ٠.٤% بوتاسيوم (K2O) وعادة يتم خلط السماد بالتراب عند أستعماله ليسهل نثره على الأرض.

والجدول التالى يوضح البقايا النباتية المختلفة وما تحتاجه من مخلوط الاسمدة الكيماوية المنشط لكل طن سماد عضوى صناعى :-

نوع البقايا النباتية	مخلوط الأسمدة الكيماوية المنشطة
قش الأرز - الحشائش الخضراء- ورق الشجر- أوراق الخضروات- البصل التالف.	١٥ كجم سلفات نشادر - ٣ كجم سوبر فسفات + ١٥ كجم كربونات كالسيوم + ١٠٠ كجم تراب.
تبين البرسيم والحلبة والقمح والشعير.	٢٠ كجم سلفات نشادر + ٤ كجم سوبر فسفات + ٤١ كجم كربونات كالسيوم + ٧٠ - ١٠٠ كجم تراب.
تبين الفول واللوبيا وعروش الطماطم وقش القصب وعروش الفول السودانى أو البطاطا أو البطاطس أو القفاص.	٢٥ كجم سلفات نشادر + ٥ كجم سوبر فسفات + ٢٥ كجم كربونات كالسيوم + ٧٠ - ١٠٠ كجم تراب.

حطب الذره - سوق الموز - حطب الترمس - حطب	٣٥ كجم سلفات نشادر + ٧ كجم سوبر فسفات + ٣٥
الخروع.	كجم كربونات كالسيوم + ٧٠ - ١٠٠ كجم تراب.

ومن المنتظر أن يعطى الطن الواحد من المادة الاصلية نحو ٢.٥ متر مكعب من السماد العضوى الصناعى.

#### خامسا: إستخدام الطحالب كمحسن للاراضى الصحراوية والمستصلحة حديثا

تلعب الطحالب الخضراء والخضراء المزرقه والحمراء دورا هاما فى الطبيعة حيث تستخدم كعلاج لخفض التلوث فى مياه البحار والأنهار، كما تستخدم بعد إستخراجها وتجفيفها فى كثير من المجالات العلمية.

ومن هذه الطحالب مجموعة واسعة الانتشار ذات قيمة اقتصادية عالية مثل :

- \* ULOTHRIX.
- \* CHLORELLA
- \* EUGLENA.
- \* ILLATORIA.
- \* NITZSCHIA.
- \* ARTHROSPIRA.

وهذه الأنواع بجانب نموها فى المياه العذبة فهى تنمو أيضا فى المياه المالحة وتقوم هذه الطحالب بإنتاج الأكسجين أثناء عملية البناء الضوئى وهذا الأكسجين يستخدم لأكسدة المخلفات والفضلات والنفايات. وفى أحيان كثيرة فإن هذه الطحالب مفيدة جدا كغذاء للأسماك وزيادة إنتاجيتها وخاصة الطحالب الخضراء والخضراء المزرقه والحمراء حيث تحتوى هذه الطحالب على النسب الآتية من المركبات الحيوية الهامة (دهون ١١-٧ % ، كربوهيدرات ١٦-١٢ % ، بروتين ٥٠-٥٥ %). إلى جانب أحتوائها على نسب مرتفعة من العناصر المعدنية الكبرى والصغرى والنادرة الهامة واللازمة للنمو والحياه. كما وجد أنها تحتوى على نسب مرتفعة من الهرمونات النباتية المختلفة مثل الأكسجين والسيتوكينين والتي تعتبر عامل هام وحيوى لنمو النباتات.

وفى محاولة لتطبيق ذلك علميا فقد تم استخراج كميات لا بأس بها من الطحالب الخضراء المزرقه من قاع البحر الأحمر - بجمهورية مصر العربية- على عمق ٢ متر من سطح البحر وتم تجفيفها فى الظل واستخدام مسحوقها أو مستخلصها فى الحالات الآتية :

١- إضافة إلى الأسمدة المستخدمة فى الأراضى الجيرية المنزرعة بمحصول الطماطم أو فول الصويا أوجد أن النمو الخضرى كان أقوى وأسرع بدرجة ملحوظة.

٢- إضافة كمستخلص للبيئات التى نمت عليها بذور الطماطم أسرع من درجة الإنبات ،كما ساعدت فى نفس الوقت على إنتاج شتلات قوية ذات تفريع خضرى غزير .

٣- إضافة كمستخلص إلى البيئات المستخدمة فى زراعة أنسجة نباتات البيكان والعنب والفول السودانى أوجد ان التفريع الخضرى والجذرى كان أسرع وبدرجة جيدة.

وقد وجد بتحليل مستخلص الطحالب أن الرقم الحامضى لها فى يتراوح بين ٥.٦-٦.٥ مما ساعد على أستخدامة فى أى أنواع الأراضى وخاصة القلوية حيث ساعد على معادلة قلويتها وبذلك كان نمو النباتات أحسن. وكذلك وجد أن كمية الكالسيوم والصوديوم والبوتاسيوم به مرتفعة جدا وهى عناصر أساسية للنمو.

سادسا: استخدام الهندسة الوراثية في انتاج واعتماد التقاوى وكذلك تجميع الأصول الوراثية في مجموعات نباتية لحفظ هذه الأصول. بهدف تحقيق الأهداف التالية :-

\* انتاج نباتات مقاومه للإصابة الحشرية والأمراض الفيروسية.

\* التسميد الحيوى باللقاحات المحوره وراثياً.

\* تحسين عناصر المكافحه الحيويه للآفات.

\* إنتاج نباتات مقاومه للظروف البيئيه الغير ملائمه مثل الملوحة والجفاف.

\* دعم برامج رسم الخرائط الوراثيه.

\* نقل موروثات التنبيت البيولوجى للأزوت الى النباتات الإقتصاديه الهامه.

ومع إستخدام الفيروسات الممرضة للحشرات فى مكافحة الآفات ظهرت العديد من المشاكل التطبيقية التى حدث بشكل كبير من إنتشار إستخدامها ضمن برامج المكافحه المتكاملة للآفات فكانت الهندسة الوراثية هى الحل الأمثل لهذه العيوب ومن ثم تحسين صفات الفيروسات الممرضة للحشرات بحيث يمكن إستخدامها ضمن برامج المكافحه المتكاملة للآفات من خلال أنتاجها :-

\* إزالة أحد جينات الفيروس.

\* إضافة أحد الجينات السامة للحشرات داخل الفيروس وبذلك يزد تأثيره.

**ومن امثلة بعض النباتات المهندسة وراثيا والتي انتجها مركز البحوث الزراعية :-**

- ١ - إنتاج نباتات كوسة مقاومة للفيروسات باستخدام استراتيجيه جين الغلاف البروتينى.
  - ٢ - إنتاج أصناف شعير معدلة وراثيا تتحمل الضغوط البيئية.
  - ٣ - إنتاج أصناف قمح تتحمل الجفاف ومقاومة للأجهاد البيئى.
  - ٤ - إنتاج نباتات موز معدلة وراثيا مقاومة للفيروسات.
  - ٥ - إنتاج نباتات ذرة لأنتاج لقاح للوقاية من الألتهاب الكبرى بفيروس B.
  - ٦ - تحديد البصمة الوراثية ورسم الخرائط الوراثية مثل الطماطم - الذرة - نخيل البلح - الكانولا - القطن.
- وقد أدى استخدام النباتات المعدلة وراثيا إلى :-

- الأنتاجية العالية للمحصول.
- خفض التكاليف الزراعية.
- زيادة العائد الأقتصادى.
- تحسن الظروف الصحية والبيئية.



- محصول آمن صحيا خالى من الكيماويات.

ثمار صحيحة خالية من الكيماويات الزراعية من أسمدة ومبيدات (٥)

